


**ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
нанесите удар
по мГЧРПЖ
с препаратом КСТАНДИ**

КСТАНДИ показан взрослым мужчинам для лечения:¹

- Каstrationно-резистентного рака предстательной железы (КРРПЖ).
- Метастатического гормоночувствительного рака предстательной железы (мГЧРПЖ).

КСТАНДИ помогает УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ваших пациентов³

КСТАНДИ + АДТ достоверно увеличивает общую выживаемость по сравнению с плацебо + АДТ, и этот эффект сохраняется при оценке в динамике^{1,3}



СОХРАНЯЕТ ЖИЗНЬ В ТЕЧЕНИЕ 4 ЛЕТ

71% при применении КСТАНДИ + АДТ по сравнению с **57%** при применении только АДТ

Медиана последующего наблюдения


44,6 мес

По материалам Armstrong AJ et al. 2022.³

¹Эти данные получены в финальном анализе исследования ARCHES (дата окончания сбора данных 28 мая 2021 г.). После первичного анализа исследование стало открытым, что позволило пациентам, получавшим плацебо + АДТ, перейти на терапию препаратом КСТАНДИ + АДТ в открытом продолжении исследования.³

КСТАНДИ может помочь ЗАМЕДЛИТЬ прогрессирование опухоли у ваших пациентов²

КСТАНДИ + АДТ достоверно снижал риск радиологического прогрессирования или смерти по сравнению с плацебо + АДТ^{*2}



61% СНИЖЕНИЕ РИСКА РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ИЛИ СМЕРТИ

Медиана последующего наблюдения

14,4 мес

По материалам Armstrong AJ et al. 2019.²




Благоприятный профиль безопасности КСТАНДИ обеспечивает низкую частоту прекращения лечения у пациентов с мГЧРПЖ³

^{*}Эти данные получены в первичном анализе исследования ARCHES (дата окончания сбора данных 14 октября 2018 г.), после медианы последующего наблюдения 14,4 месяца.²

КСТАНДИ помогает УВЕЛИЧИТЬ ВЫЖИВАЕМОСТЬ³ без ухудшения КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ваших пациентов²

Добавление препарата КСТАНДИ к АДТ не оказывало негативного влияния на качество жизни пациентов по сравнению с применением только АДТ^{2,4}



По материалам дополнения к Armstrong AJ et al. 2019.⁴




Начните лечение с препарата КСТАНДИ, чтобы увеличить выживаемость и сохранить качество жизни своих пациентов

КСТАНДИ хорошо переносится пациентами и характеризуется минимальным риском возникновения сыпи^{*1-3}

Большинство нежелательных явлений, отмеченных в исследовании ARCHES^{†2}




Частота прекращения лечения из-за НЯ была сопоставима в обеих группах²



КСТАНДИ + АДТ

VS



Плацебо + АДТ

^{*}В первичном анализе исследования ARCHES сыпь (всех степеней) была зарегистрирована у 2,6% пациентов в группе КСТАНДИ+АДТ и у 1,6% пациентов в группе плацебо+АДТ. О случаях сыпи ≥3 степени не сообщалось.²

[†]НЯ, зарегистрированные у ≥5% пациентов в любой группе лечения, перечислены в порядке убывания предпочтительного термина. Ни одно из наиболее частых НЯ не имело степени 5.2

Литература:

1. Общая характеристика лекарственного препарата Кстанди (ЛП-№(002449)-(РГ-RU) от 31.05.2023) доступна на информационном портале Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» <http://eec.eaeunion.org/>
2. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2019;37(32):2974–2986.
3. Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2022;40(15):1616–1622.
4. Supplement to: Armstrong AJ et al. J Clin Oncol 2019;37(32):2974–2986.

АДТ=андрогендепривационная терапия; ДИ=доверительный интервал; мГЧРПЖ=метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы; НЯ=нежелательные явления.

Информация предназначена для специалистов здравоохранения.



ООО «Астеллас Фарма Продакшен»
Россия, 109147, Москва, ул. Марксистская, 16
Тел.: +7 (495) 737-07-56

MAT-RU-XTD-2023-00042-OCT-2023-BORGES-2000

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ